

СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 12419—66
	ШКУРКИ КОЛОНКА И СОЛОНГОЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ Kolinsky and solongoi skins undressed	Взамен ГОСТ 6372—62 и ГОСТ 6487—53
		Группа С82
<p>1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки колонка и солонгоя (горного колонка) из отряда хищных, семейства куньих.</p> <p>2. Шкурки колонка имеют волосяной покров рыжевато-желтого цвета, а шкурки солонгоя — с более низким волосяным покровом песочно-желтого цвета.</p> <p>3. Шкурки колонка и солонгоя должны быть сняты чулком с головы, с закрытым огузком или трубкой, с сохранением меха головы (с носиком), лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, хрящей и сухожилий, костей на лап и хвоста; очищены от грязи и запекшейся крови с мездры и волоса; оправлены мездрой наружу на правилках установленной формы с отношением ширины шкурки к ее длине 1:8 (для шкурок колонка) и 1:7 (для шкурок солонгоя) и законсервированы пресно-сухим способом; мездра должна быть хорошо обезжирена без повреждения корней волос.</p> <p>4. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения колонка шкурки подразделяются по кряжам в соответствии с табл. 1.</p>		
Таблица 1		
Наименование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
1. Амурский	Амурская область, кроме Желтуловского, Зейского и Тыгдинского районов; Приморский край; Амурский, Бикинский, Вяземский, Комсомольский, им. Лазо, Нанайский, Ульчский, Хабаровский районы Хабаровского края и Еврейская автономная область	Густой, высокий, грубоватый
Внесен Центросоюзом	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 17/XII 1966 г.	Срок введения 1/VII 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 3 коп.

Перепечатка воспрещена

Продолжение

Наименования краев	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
2. Тобольский	Новосибирская, Томская, Тюменская, Омская, Свердловская, Курганская и Челябинская области	Высокий, густой и малошелковистый. Мездра плотная и менее плотная
3. Башкирский	Башкирская АССР; Татарская АССР; Пермская область	Менее густой, мездра плотная
4. Енисейский	Красноярский и Алтайский край; Тувинская АССР; Кемеровская область; Казахская ССР	Высокий, шелковистый. Мездра менее плотная
5. Якутский	Якутская АССР; Бадайбинский, Братский, Жигаловский, Катайский, Качугский, Казачинский, Левский, Киренский, Нижне-Илимский, Усть-Кутский, Мамско-Чуйский, Нижнеудинский районы Иркутской области; Каларский, Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский районы Читинской области; Желтулакский и Зейский районы Амурской области; Хабаровский край, кроме районов, указанных в Амурском крае; Северо-Байкальский и Баунтовский районы Бурятской АССР	Густой, шелковистый. Мездра плотная
6. Забайкальский	Иркутская, Читинская области и Бурятская АССР, кроме районов, указанных в Якутском крае; Тындинский район Амурской области	Густой, малошелковистый. Мездра плотная

Примечание. Шкурки, поступившие из районов, не перечисленных в табл. 1, относятся к тому краю, которому они соответствуют по качеству волосяного покрова.

Шкурки колонка и солонгоя невыделанные

ГОСТ 12419—66

5. По размерам шкурки колонка и солонгоя должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование породы	Площадь шкурок в см ²		
	Крупный	Средний	Мелкий

Шкурки колонка

1. Амурский	Более 525	Более 425 до 525 вкл.	До 425 вкл.
2. Тобольский	Более 475	Более 350 до 475 вкл.	До 350 вкл.
3. Башкирский	Более 480	Более 380 до 480 вкл.	До 380 вкл.
4. Енисейский	Более 400	Более 325 до 400 вкл.	До 325 вкл.
5. Якутский	Более 340	Более 260 до 340 вкл.	До 260 вкл.
6. Забайкальский	Более 300	Более 225 до 300 вкл.	До 225 вкл.

Шкурки солонгоя

Более 250	Более 150 до 250 вкл.	До 150 вкл.
-----------	--------------------------	-------------

Примечание. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее от середины междуглазья (по средней линии хребта) до корня хвоста на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

6. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки колонка и солонгоя делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурок	
	колонка	солонгоя
Первый	Полноволосый, развившийся, с высокой частой остью и густым пухом. Мездра без синевы. Хвост пушистый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом. Мездра чистая

Продолжение

Сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурки	
	колонка	солонгой
Второй	Менее полноволоосый, с недостаточно развитыми остью и пухом. Мездра с легкой синевой по хребту от огузка до половины шкурки. Хвост недостаточно опушен	Полуволосый, с недостаточно развитыми остью и пухом. Мездра синеватая
Третий	Полуволосый со слабо развитыми остью и пухом. Мездра синеватая. Хвост слабо опушен	—

7. В зависимости от наличия пороков шкурки подразделяют по дефектам на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
1. Разрывы общей длиной в процентах к длине шкурки	До 10,0 вкл.	10,1—20,0	20,1—50,0; шкурки, перерваные поперек
2. Дыры и вытертые места в процентах к общей площади шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Плесенины в процентах к общей площади шкурки	Не допускаются	До 1,0	1,1—2,0

Продолжение

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
4. Прострелы дробовые:			
шкурки колонка	От 2—5	6—8	9—12
шкурки солонгой	До 3 вкл.	4—5	6—8
5. Признаки ливьки	Не допускаются	Ранневесенние с редковатым волосяным покровом на боках или шейной части. Мездра утолщенная, с темной полоской у огузка	—

Примечание. Шкурки с дробовыми прострелами у колонка от 2 до 5, у солонгой до 3, независимо от их количества на голове до шеи относятся к группе дефектов «малый»; шкурки колонка с прострелами от 6 до 8, а у солонгой от 4 до 5, независимо от их количества на голове и шее относятся к группе дефектов «средний» при отсутствии пороков на остальной части шкурки.

8. На шкурках, относимых к группе дефектов «малый», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов.

На шкурках, относимых к группе дефектов «средний», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов, или двух пороков на группы дефектов «малый».

На шкурках, относимых к группе дефектов «большой», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «средний», или одного порока группы дефектов «средний» и двух пороков группы дефектов «малый».

9. Шкурки, пороки которых превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», а также прелые, горелые, поврежденные молью оцениваются не более 25% стоимости первого сорта крупного размера.

10. Шкурки колонка и солонгоя весенние и поздневесенные с сильно поредевшим волосяным покровом или выпадающим волосом; летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха; раннеосенние с едва начавшими развиваться остью и пухом; шкурки детенышей с пухлявым волосом относятся к нестандартным.

11. Упаковку и маркировку шкурок колонка и солонгоя производят по ГОСТ 12266—66.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 12419-66

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок в процентах в процентах к стоимости шкурок первого сорта крупного размера
(рекомендована Центросоюзом)

Колонки

Размеры шкурок	Сорта											
	Первый				Второй				Третий			
	Группы дефектов		Группы дефектов		Группы дефектов		Группы дефектов		Группы дефектов		Группы дефектов	
Крупный Средний Мелкий	Малый	Средний	Большой	Малый	Средний	Большой	Малый	Средний	Большой	Малый	Средний	Большой
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	56,3	37,5	67,5	56,3	37,5	45,0	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	56,3	42,2	28,1	50,7	42,2	28,1	33,8	18,8
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	37,5	28,1	18,8	33,8	28,1	18,8	22,5	12,5

Солонгой

Размер шкурок	Сорта											
	Первый				Второй							
	Группы дефектов		Группы дефектов		Группы дефектов		Группы дефектов					
Крупный Средний Мелкий	Малый	Средний	Большой	Малый	Средний	Большой	Малый	Средний	Большой	Малый	Средний	Большой
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	50,0	50,0	45,0	37,5	45,0	37,5	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	56,3	37,5	37,5	33,8	28,1	33,8	28,1	18,8
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	37,5	25,0	25,0	22,5	18,8	22,5	18,8	12,5

Склады в процентах от зачетной стоимости шкурок колонки и солонгой: за нестандартную правку — 10,0; за отсутствие хвоста — 10,0; за отсутствие головы до шеи — 10,0; за отсутствие головы с шей — 25,0.

РАЗРАБОТАН Центросоюзом

Начальник Главкоопжирсырье **Потапов С. В.**
Исполнитель ст. экономист-товаровед **Лунашов Н. И.**

ВНЕСЕН Центросоюзом

Член правления Центросоюза **Потапов С. В.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ отделом легкой промышленности Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Начальник отдела **Богатов А. В.**
Ст. инженер **Берсенева З. К.**

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Щусева, 4.

Сдано в наб. 22/XII 1966 г. Подл. в печ. 6/1 1967 г. 0,5 л. л. Тир. 10000

Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 3035

Контр. Экз.

Изменение № 1 ГОСТ 12419—66 Шкурки колонка и солонгоя невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.08.88 № 3001

Дата введения 01.02.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7883.

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки прелые, гнилые, поврежденные молью, шкурки весенние и поздневесенние с сильно поврежденным волосяным покровом или выпадающим волосом, летние с низким, редким волосяным покровом, почти без пуха, раннеосенние с едва начавшим выпадением остью и пухом, шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом относятся к нестандартным».

Пункт 10 исключить.

Приложение. Таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Нестандартные шкурки оценивают не более 25 % качества шкурок первого сорта каждого размера группы дефектов «нормальная».

(ИУС № 12 1988 г.)