


СССР Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ		ГОСТ 13055—67
	ШКУРЫ ВОЛКА И ШАКАЛА НЕВЫДЕЛАННЫЕ Wolf and jackal skins undressed		Взамен ОСТ НКЗат 387 и ГОСТ 6609—53 Группа С82
<p>1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры волка и шакала из отряда хищных, семейства собачьих.</p> <p>2. Зимние шкуры волка имеют волосяной покров темно- и светло-голубого, темно- и светло-серого, серо-бурого и темно-рыжего цветов. По характеру волосяного покрова шкуры волка подразделяют на мягкий—лесной и грубый—степной.</p> <p>3. Зимние шкуры шакала имеют волосяной покров темно-серого или ржаво-серого цветов с буроватой полосой по хребту.</p> <p>4. Шкуры волка и шакала должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста, хрящей и сухожилий; хорошо обезжирены, оправлены волосом наружу по установленной форме и законсервированы пресно-сухим способом.</p> <p>5. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения волка шкуры подразделяют по кряжам в соответствии с табл. 1.</p>			
Таблица 1			
Наименование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова	
1. Полярный	Камчатская область; Чукотский национальный округ Магаданской обл.; северные районы Якутской АССР; Таймырский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий национальные округа; Мурманская область	Особо пышный, светло- и темно-голубого цвета с серо-голубым пухом; ость блестящая. Червое рослое, шелковистое. Хвост пушистый	
Внесен Центросоюзом	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 12/VII 1967 г.		Срок введения 1/VII 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена



ГОСТ 13055—67

Шкуры волка и шакала, невыделанные

Продолжение

Наименование края	Главные районы распространения	Характеристика волосного покрова
2. Сибирский	Восточная и Западная Сибирь, кроме областей и округов, указанных в полярном крае; Свердловская, Челябинская и Курганская обл.; Северо-Казахстанская, Кокчетавская, Павлодарская, Семипалатинская и Восточно-Казахстанская обл. Казахской ССР	Пышный и грубоватый серо-голубой, темно-серый с голубым пухом или серо-буроватым оттенком по хребту
3. Казахский	Казахская ССР, за исключением областей, указанных в Сибирском крае; северная часть Киргизии	Пышный светло-серого цвета и голубоватый серовато-желтого цвета
4. Центральный	Белорусская, Латвийская, Литовская и Эстонская ССР; Европейская часть РСФСР, за исключением районов, указанных в Южном крае	Менее пышный, грубоватый и грубый серого и темно-серого цвета с серо-бурым оттенком по хребту
5. Южный	Украинская, Туркменская, Таджикская, Молдавская, Грузинская, Армянская и Азербайджанская ССР; южные районы Киргизской ССР; Ставропольский край, Краснодарский край, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская АССР	Грубоватый и грубый светло-серого, серовато-желтого и темно-рыжего цвета по хребту

Примечания

1. Шкуры, поступающие из районов, не перечисленных в табл. 1, относят к тому краю, которому они соответствуют по качеству волосного покрова.

2. Шкуры шакала по краям не подразделяют.

6. В зависимости от качества волосного покрова и мездры шкуры волка и шакала подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Характеристика волосного покрова и мездры шкур
Первый	Полноволосый, с развившимся волосным покровом, с высокой частой остью и густым пухом; мездра чистая
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся остью и пухом; мездра синеватая
Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом; мездра синяя

7. В зависимости от наличия пороков шкуры волка и шакала подразделяются на группы дефектов в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
1. Разрывы общей длиной к длине шкуры в %	20,1—40,0	40,1—80,0	Более 80,0 до однократной длины шкуры
2. Дыры и вытертые места общей площадью к площади шкуры в %	0,5—1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Плесени общей площадью к площади шкуры в %	До 0,5	0,6—1,0	1,1—2,0
4. Признаки весенней линьки	Не допускаются	Шкуры ранневесенние, перерыве с поредевшим волосяным покровом на боках, огулке или шейной части	Шкуры несезонные со значительной потертойостью волосяного покрова на боках, огулке или сильно поредевшим волосяным покровом на шейной части и лопатках

Примечание. Шкуры волка и шакала, имеющие разрывы общей длиной до 20% длины шкуры, дыры и вытертые места до 0,5% площади шкуры, дефектными не считают.

8. На дефектных шкурах допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурах, относимых к группе дефектов «средний», два различных порока группы дефектов «малый»;

на шкурах, относимых к группе дефектов «большой», два различных порока группы дефектов «средний».

При совокупности одного порока, относимого к группе дефектов «средний», и двух пороков, относимых к группе дефектов «малый», шкуры переводят в группу дефектов «большой».

9. Шкуры волка и шакала, пороки которых превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкуры поздневесенние в стадии явной линьки с выпадающим во-

лосяным покровом, летние, шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также шкуры прелые, горелые, поврежденные молью и кожедом оцениваются не более 25% стоимости первого сорта.

10. Упаковку и маркировку шкур волка и шакала производят по ГОСТ 12266—66.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА

оценки качества шкур волка и шакала в процентах
и стоимости первого сорта
(рекомендована Центросоюзом)

Сорта	Нормальные	Группы дефектов		
		Малый	Средний	Большой
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	75,0	67,5	56,3	37,5
Третий	50,0	45,0	37,5	25,0

Скидки от зачетной стоимости в %

За необезжиренность	10
За отсутствие меха головы	10
За отсутствие меха головы с шеей или черева	25
За комовую сушку	25

ВНЕСЕН Центросоюзом

Член правления Центросоюза Горностаев С. Т.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ отделом легкой промышленности Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Начальник отдела Богатов А. В.

Инженер Чацкая Л. С.

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Председатель научно-технической комиссии (зам. председателя Комитета) Милованов А. П.

Зам. председателя комиссии Богатов А. В. (член Комитета)

Члены комиссии—Антоновский А. И., Данилова В.С.

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Щусова, 4.
Сдано в наб. 23/X 1967 г. Подл. и печ. 30/X1 1967 г. 0,25 л. л. Тир. 10 000

Калужская типография Издательства стандартов, ул. Московская, 256. Заказ 2033

Изменение № 1 ГОСТ 13055—67 Шкуры волка и шакала невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.06.88 № 1707

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7852, 98 7853.

Пункт 5. Таблицу 1 дополнить примечанием — 3: «3. Основным показателем кража является характеристика волосяного покрова. Районы распространения являются дополнительным признаком».

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкуры позавесе-

(Продолжение см. с. 360)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13055—67)

севиные в стадии ярной линьки с выпадающим волосяным покровом, летние, шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также шкуры прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным».

Приложение дополнить словом: «**Обязательное**»;

таблицу дополнить примечанием: «**Примечание.** Шкуры нестандартные оценивают не более 25 % от качества первого сорта группы «нормальная»;

«Скидки от зачетной стоимости, %» изложить в новой редакции:

«10 — за необезжиренность, за отсутствие головы;

25 — за отсутствие головы с шеей или черепа, за комовую сушку».

(ИУС № 9 1988 г.)