



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ СОБОЛЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ,
ДОБЫТЫЕ ОХОТОЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 27571—87

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

БЗ 8—98 10 см

**ШКУРКИ СОБОЛЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ,
ДОБЫТЫЕ ОХОТОЙ**

Технические условия

Raw sable skins obtained by hunting.
Specifications

ГОСТ

27571—87

ОКП 98 7881

Дата введения 01.01.89

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки вольного соболя, добытые охотой.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки соболя должны быть сняты с тушек «трубкой» или «чулком» с сохранением меха с головы (с носиком и ушами), лап (с коготками) и хвоста. При снятии шкурок «трубкой» разрез кожной ткани проходит по линии волосораздела задних конечностей от подушечек к анальному отверстию; дополнительные разрезы — по передним конечностям от подушечек до локтевого сустава и нижней поверхности хвоста. При снятии шкурок «чулком», разрез кожной ткани проходит вокруг рта в месте соединения губ с деснами; дополнительный разрез по нижней поверхности хвоста. Шкурки должны быть очищены от прирезей мышц, хрящей из ушей, сухожилий, костей из лап и хвоста, грязи, крови и смолы с кожной ткани и волосяного покрова; обезжирены без повреждения корней волос; оправлены на правилках волосом наружу по форме, соответствующей данному краю, и законсервированы пресно-сухим способом.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

© Издательство стандартов, 1994

Переиздание с изменениями

2—137

1.3. Шкурки соболя в зависимости от состояния волосяного покрова и кожной ткани, районов распространения и формы правки подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

Группа кряжей	Наименование кряжей	Характеристика волосяного покрова, кожной ткани и форма правки	Основные районы распространения
Первая	Баргузинский	Волосяной покров густой, пышный, шелковистый. Хвост пышный. Кожевая ткань плотная, средней толщины. Правка округлая с открытым и закрытым огузком. Передние лапы при правке с закрытым огузком разрезаны пластом и заправлены внутрь шкурки, задние наружу. Соотношение длины к ширине 2:1	Бурятская АССР, Хабаровский край, кроме районов, указанных в Амурском кряже; Амурская, Иркутская, Читинская области
	Камчатский	Волосяной покров пышный и густой, с высокой грубоватой остью. Хвост пышный. Кожевая ткань плотная, утолщенная. Правка округлая с закрытым огузком, лапы заправлены внутрь шкурки. Соотношение длины шкурки к ширине 2:1	Камчатская и Магаданская области
	Якутский	Волосяной покров пышный, шелковистый уравниный со средней высоты остью. Хвост пышный. Кожевая ткань тонкая, эластичная. Правка округлой формы с закрытым огузком, лапы заправлены внутрь шкурки. Соотношение длины к ширине шкурки 2:1	Якутская АССР; Хабаровский край, кроме районов, указанных в Амурском кряже; Амурская область
	Сахалинский	Волосяной покров густой, с уравниной короткой грубоватой остью. Хвост менее пышный. Кожевая ткань плотная, средней толщины. Правка округлой формы с закрытым огузком, лапы заправлены внутрь шкурки. Соотношение длины к ширине шкурки 2:1	Сахалинская область
Вторая	Амурский	Волосяной покров менее пышный и шелковистый с низкой уравниной остью. Хвост пышный. Кожевая ткань тонкая эластичная. Правка округлой формы с закрытым огузком, лапы заправлены внутрь шкурки. Соотношение длины к ширине шкурки 2:1	Бурятская АССР, южные районы озера Байкал; Хабаровский край, южные районы; Приморский край

Продолжение табл. 1

Группа кражей	Наименование кражей	Характеристики пушесного покрова, кожной ткани и формы правки	Основные районы распространения
Вторая	Мушкетерский	Волосной покров густой с короткой шелковистой остью, Хвост пышный. Кожевая ткань рыхлая, средней толщины. Правка удлиненной формы с открытым огузком, передние лапы заправлены внутрь шкурки. Соотношение длины к ширине шкурки 4,5:1	Красноярский край, бассейн р. Усы
	Алтайский	Волосной покров пышный, густой, грубоватый, ость со слегка закрученными концами. Хвост менее пышный. Кожевая ткань плотная, утолщенная. Правка удлиненной формы с открытым огузком, передние лапы заправлены внутрь шкурки. Соотношение длины к ширине шкурки 4,5:1	Алтайский край
	Енисейский	Волосной покров пышный от шелковистого до грубого, с уравненной средней высоты остью. Хвост пышный. Кожевая ткань плотная, средней толщины. Правка с закрытым и открытым огузком, лапы опрaвлены наружу шкурки. Соотношение длины к ширине шкурки 3:1	Красноярский край, западные районы, Кемеровская и Томская области, восточные районы
	Тобольский	Волосной покров пышный, густой, грубоватый. Хвост пышный. Кожевая ткань плотная, утолщенная. Правка с закрытым и открытым огузком, лапы опрaвлены наружу шкурки. Соотношение длины к ширине шкурки 3:1	Тюменская, Свердловская и Томская области, районы реки Нарым и ее притоков
Третья	Тувинский	Волосной покров шелковистый, недостаточно густой с высокой остью. Хвост пышный. Кожевая ткань плотная средней толщины. Правка удлиненной формы с закрытым и открытым огузком, передние лапы заправлены внутрь шкурки. Соотношение длины к ширине шкурки 4,5:1	Тувинская АССР

Примечание. Основным показателем качества кража является характеристика волосного покрова. Правка шкурок и районы распространения являются дополнительным признаком.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют по цветам в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Цвет	Характеристика окраски волосяного покрова
<p>Первый (Головка высокая и нормальная и подголовка высокая)</p> <p>Второй (Подголовка нормальная)</p> <p>Третий (Воротовой темный)</p> <p>Четвертый (Воротовой нормальный, меховой)</p>	<p>Первая группа кряжей Волосяной покров темный с черной остью. Пух темно-серый с голубоватым оттенком. Концы пуха могут иметь незначительно осветленный или коричневый оттенок</p> <p>Волосяной покров менее темный, ость темная и темно-бурая. Пух темно-серый. Концы пуха осветленные с голубоватым оттенком</p> <p>Волосяной покров темно-каштановый, пух серый с каштановым оттенком на концах</p> <p>Волосяной покров более светлый, каштанового и песочного оттенков ости с осветленным пухом</p>
<p>Первый (Головка высокая и нормальная и подголовка высокая)</p> <p>Второй (Подголовка нормальная)</p> <p>Третий (Воротовой темный)</p> <p>Четвертый (Воротовой нормальный, меховой)</p>	<p>Вторая группа кряжей Волосяной покров темный с темно-бурой остью. Пух темно-серый и серый с голубоватым оттенком. Концы пуха с осветленным темно-каштановым оттенком</p> <p>Волосяной покров темно-каштановый. Ость темно-бурая и темно-каштановая. Пух серый, допускается коричневый оттенок. Концы пуха с каштановым оттенком</p> <p>Волосяной покров каштанового цвета. Ость бурая или каштановая. Пух серый с коричневым или песочным оттенком на концах</p> <p>Волосяной покров более светлый, светло-каштанового и песочного оттенков и другие светлые тона, не описанные выше. Пух различных светлых оттенков</p>
<p>Первый (Головка высокая и нормальная и подголовка высокая)</p> <p>Второй (Подголовка нормальная)</p> <p>Третий (Воротовой темный)</p> <p>Четвертый (Воротовой нормальный, меховой)</p>	<p>Третья группа кряжей Волосяной покров темный. Пух темно-серый с голубоватым оттенком. Концы пуха могут иметь осветленный или темно-коричневый оттенок</p> <p>Волосяной покров менее темный, ость темная и темно-бурая. Пух серый. Концы пуха осветленные с темно-каштановым оттенком</p> <p>Волосяной покров темно-каштановый, пух серый с каштановым или коричневатым оттенком на концах</p> <p>Волосяной покров светло-каштанового и песочного оттенков ости с осветленным пухом</p>

Примечание. Наличие на шкурках соболя серебристых (седых) волос и горлового пятна при определении цвета не учитывают.

1.5. В зависимости от состояния волосяного покрова и кожной ткани шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожной ткани
1	Шкурки полноволосые с развитой блестящей остью и густым пухом. Хвост хорошо опушен. Кожная ткань светлая. Допускается легкая синева на хвосте и лапах
2	Шкурки менее полноволосые с недоразвитым остью и пухом. Хвост менее пышный. Кожная ткань с легкой синевой

1.6. В зависимости от наличия пороков шкурки соболя подразделяют на группы в соответствии с требованиями табл. 4.

Таблица 4

Наименование порока	Группы			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы, швы общей длиной, см	До 3 включ.	Св. 3 до 10 включ.	Св. 10 до 20 включ.	Св. 20 до однократной длины шкурки или шкурки, разорванные поперек
2. Дыры, вытертые места общей площадью, см ²	Не допускаются	До 3 включ.	Св. 3 до 5 включ.	Св. 5 до 15 включ.
3. Пleshны общей площадью, см ²	Не допускаются	Не допускаются	До 3 включ.	Св. 3 до 10 включ.
4. Сквозной волос общей площадью, см ²	Не допускается	До 30 включ.	Св. 30 до 60 включ.	Св. 60 до 90 включ.
5. Компенсационная лямка с наличием темных пятен на кожной ткани с неравным волосяным покровом, темными пятнами на кожной ткани или	До 1 включ.	Св. 1 до 5 включ.	Св. 5 до 10 включ.	Св. 10 до 20 включ.

Продолжение табл. 4

Наименование порока	Группы			
	первая	вторая	третья	четвертая
белыми пегинами по волосу общей площадью, см ²				
6. Смоляной закат общей площадью, см ²	До 1 включ.	Св. 1 до 5 включ.	Св. 5 до 10 включ.	Св. 10 до 20 включ.
7. Недостача частей	1 лапы	Хвоста или 2—3 лап	Головы или 4 лап	Головы с шеей или черева
8. Признаки ранневесенней лямки	Не допускаются	Не допускаются	Легкое поредение	Поредение

Примечание. Отдельные некушные темные пятна компенсационной лямки на кожной ткани при равномерном волосяном покрове пороком не считают.

1.7. На шкурках, относящихся ко второй группе, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы.

На шкурках, относящихся к третьей группе, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй группы.

На шкурках, относящихся к четвертой группе, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков третьей группы или одного порока третьей группы и одного-двух пороков второй группы или трех пороков второй группы.

При отнесении шкурок ко второй, третьей или четвертой группам пороки, допущенные для первой группы, не учитывают.

Характеристика пороков дана в приложении 1.

1.8. Оценку качества шкурок соболя производят в соответствии с приложением 2.

1.9. Упаковка и маркировка шкурок соболя — по ГОСТ 12266—89.

1.10. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

2. ПРИЕМКА

2.1. Шкурки соболя принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Проверке на соответствие требованиям настоящего стандарта по показателям внешнего вида подвергают каждую шкурку.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Поредение ости на боках устанавливают в положении шкурки, перегнутой посередине хребта и черева.

3.2. Определение площадного порока производят путем умножения показателей его длины и ширины.

Ливейный порок измеряют в сантиметрах.

Если участок поврежден в виде ломаных, изогнутых линий, то поврежденный участок вписывают в наименьший прямоугольник и определяют его размер в квадратных сантиметрах путем умножения показателей длины и ширины поврежденного участка шкурки.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Шкурки соболя транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

Порок	Характеристика
Дыра	Сквозное отверстие в кожной ткани шкурки с потерей ее площади
Вытертые места	Участки шкурки, частично или полностью лишенные волосного покрова в результате механического повреждения
Разрыв	Повреждение кожной ткани шкурки в виде прямой или ломаной сквозной линии без потери ее площади
Шов	Линейные сквозные повреждения кожной ткани шкурки, края которой сшиты
Плешина	Участки шкурки, лишенные волосного покрова вследствие кожного заболевания
Сквозной волос	Обнажение корней волос и выпадение их
Компенсационная лямка с наличием темных пятен на кожной ткани	Участок шкурки с коротким растущим волосным покровом после заживления поврежденных мест, которым сопутствует наличие темных пигментированных пятен
Смоляной закат	Участок шкурки с закатанным и сплюснутым волосным покровом, испачканным смолой
Плохо обезжиренные шкурки	Шкурки с наличием остаточного жира на кожном и волосном покрове
Окровавленные шкурки	Шкурки с наличием засохшей крови на кожном и волосном покрове
Горелая шкурка	Разрушение или потеря прочности кожного покрова плохо обезжиренной шкурки, сопровождающееся появлением коричневого оттенка, в результате длительного хранения
Прелая шкурка	Разложение кожной ткани шкурки в результате несвоевременного или неправильного консервирования
Неправильно оправленные шкурки	Шкурки правленные пластом
Выцветшая шкурка	Шкурка с потускневшим волосным покровом, с остатками жира желтого цвета на кожной ткани, вследствие длительного хранения
Шкурки, поврежденные молью	Повреждение волосного покрова и кожной ткани шкурки личинками моли
Шкурка, поврежденная кожеедом	Повреждение участков шкурки жуками и их личинками

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ТАБЛИЦА
оценки качества шкурок соболя в процентах
(Рекомендована Центросоюзом, согласована с Госкомшени СССР)

Цвет	Сорт							
	1-й				2-й			
	Группа пороков							
	первая	вторая	третья	четвертая	первая	вторая	третья	четвертая
Первый	100	90	75	50	80	72	60	40
Второй	80	72	60	40	64	57,6	48	32
Третий	70	63	52,5	35	56	50,4	42	28
Четвертый	55	49,5	41,3	27,5	44	39,6	33	22

Примечания:

1. Скидка от оценки по качеству в процентах:

10 — за шкурки, плохо обезжиренные, сильно загрязненные, окровавленные, неправильной формы правки;

25 — за шкурки с выцветшим волосяным покровом.

2. Пороки на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, установленных за недостачу этих частей.

3. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков, а также шкурки прелые, торельные, поврежденные молью и кожеедом, шкурки раннеосенние, летние, весенние и позднеосенние (со значительно поредением и выпавшим волосяным покровом), шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом относят к нестандартным и оценивают не более 26% оценки качества шкурок 1-го сорта, первого цвета соответствующей группы кражей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центросоюзом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Е. А. Григорьев, В. В. Судаков, В. Г. Сафонов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 25.12.87 № 5063

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ОСТ НКЗар 414

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12266—89	1.9
ГОСТ 14192—77	1.10

6. Переиздание (май 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1989 г. (ИУС 2—90)

Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор Н. Л. Шнайдер

Сдано в наб. 12.04.94. Подп. в печ. 13.05.94. Усл. п. л. 0,70. Усл. кр.-отт. 0,70.
Уч.-изд. л. 0,57. Тир. 227 экз. С 1320.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 137