



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЭМБРИОНЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28424—90

Издание официальное

10 коп. БЗ 7—89/568



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

ЭМБРИОНЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Технические условия
Cattle embryos,
Specifications

ГОСТ
28424—90

ОКП 98 8500

Срок действия с 01.01.91
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на эмбрионы крупного рогатого скота и устанавливает требования к свежеполученным и замороженным эмбрионам, предназначенным для пересадки животным-реципиентам.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Эмбрионы крупного рогатого скота должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть получены в соответствии с правилами по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота и ветеринарно-санитарными требованиями к центрам и пунктам по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Эмбрионы для пересадки должны быть получены от клинически здоровых коров-доноров в возрасте от 3 лет и старше, осемененных спермой быков-улучшателей.

1.3. Характеристики


1.3.1. Эмбрионы, пригодные для пересадки, должны быть в возрасте 7—9 сут и находиться в стадии развития ранней морулы (Мо1, черт. 1—4), поздней морулы (Мо2, черт. 5—8), ранней бластоцисты (Бл1, черт. 9—12) и поздней бластоцисты (Бл2, черт. 13—16).

1.3.2. Эмбрионы в зависимости от морфологических показателей подразделяют на «отличные», «хорошие», «удовлетворительные», «условно пригодные» и «плохие» в соответствии с требованиями, указанными в таблице.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1990


2 Зак. 261




Черт. 1 — Морула ранняя, отличная




Черт. 2 — Морула ранняя, хорошая




Черт. 3 — Морула ранняя, удовлетворительная. Неравномерные шары дробления. Грануляция в бластомерах




Черт. 4 — Морула ранняя, условно пригодная. Рыхлые бластомеры




Черт. 5 — Морула поздняя, отличная




Черт. 6 — Морула поздняя, хорошая. Выступающие светлые бластомеры




Черт. 7 — Морула поздняя, удовлетворительная. Частичный зрелый. Часть бластомеров выступает и разрушена




Черт. 8 — Морула поздняя, условно пригодная. Грануляция значительной части комплекса




Черт. 9 — Бластоциста ранняя, отличная



Черт. 10 — Бластоциста ранняя, хорошая




Черт. 11 — Бластоциста ранняя, удовлетворительная. Сжатие комплекса, трещина зоны пеллюцида




Черт. 12 — Бластоциста ранняя, условно пригодная, деформация, сжатие клеток




Черт. 13 — Бластоциста поздняя,
отличная



Черт. 14 — Бластоциста поздняя,
хорошая



Черт. 15 — Бластоциста поздняя,
удовлетворительная. Сжатие клеточ-
ного комплекса, незначительный скол
зоны



Черт. 16 — Бластоциста поздняя, ус-
ловно пригодная. Сжатие клеточного
комплекса. Скол зоны

Морфологические показатели качества эмбрионов с оценкой					
Стадии развития эмбриона	отличные	хорошие	удовлетворительно	условно пригодные	плохие
<p>Морула ранняя (Мо1), Морула поздняя (Мо2)</p>	<p>Зона пеллюцида округлой формы, без трещин и сколов, соединена с цитотелангом перивителлиновым пространством; перивителлиновое пространство без цитотелангических включений; blastomeres четкие, прозрачные, одинаковой формы и размера, расположены симметрично</p>	<p>Зона пеллюцида округлой формы, без трещин и сколов, соединена с цитотелангом перивителлиновым пространством; в перивителлиновом пространстве гранул и включений; blastomeres расположены ассиметрично, несимметрично, неравномерно по размеру, немного сжаты</p>	<p>Зона пеллюцида округлой формы или с небольшой деформацией; допускается небольшая трещина или скол. В перивителлиновом пространстве гранул, включений blastomeres расположены ассиметрично, (или) смещены относительно центра, отдельные blastomeres темного цвета, грануляция отдельных blastomeres</p>	<p>Зона пеллюцида округлой формы или деформированная, имеется значительная трещина или скол, частично нарушена связь с цитотелангом перивителлиновое пространство значительное количество blastomeres смещены относительно центра, связь между отдельными blastomeres отсутствует, видна большая часть blastomeres, blastomeres темного цвета</p>	<p>Зона пеллюцида округлой формы или деформированная, размеры оболочки с частыми вывалами blastomeres точного количества, нарушена связь с цитотелангом перивителлиновое пространство; перивителлиновое пространство; blastomeres темного цвета, грануляция отдельных blastomeres</p>
<p>Бlastocиста ранняя (Бл1)</p>	<p>В стадии раннего blastocиста (Бл1) наблюдается начало образования trophoblasta и эмбриобласта, видна небольшая blastocиста. Trophoblast на фоне клеточного комплекса выявляется в виде более яркого просветления</p>	<p>Trophoblast выявляется в виде яркого просветления, смещен относительно центра</p>	<p>Trophoblast трудно различим на фоне клеточного комплекса</p>		

Продолжение

Морфологические показатели качества эмбрионов с оценкой					
Стадия развития эмбриона	отличны	хорошие	умовлетворительные	условно пригодные	плохие
Бластоциста поздняя (Бл. 2)	<p>Зона пеллюцида округлой формы, прозрачная без трещин и сколов; перивителлиновое пространство отсутствует; blastopole большая, расширенная, прозрачная; клетки трофобласта четко выражены; эмбриобласт округлой формы с одной или двумя выделенными клетками клеточного комплекса</p>	<p>Зона пеллюцида округлой формы; без трещин и сколов; перивителлиновое пространство отсутствует; blastopole большая, расширенная, прозрачная; клетки трофобласта четко выражены; эмбриобласт округлой формы с одной или двумя выделенными клетками клеточного комплекса</p>	<p>Зона пеллюцида округлой формы, прозрачная, допускается незначительная трещина или скол; перивителлиновое пространство отсутствует; blastopole большая, расширенная, прозрачная; клетки трофобласта четко выражены; эмбриобласт округлой формы, компактная с выделенными клетками от клеточного комплекса</p>	<p>Зона пеллюцида округлой формы или деформированная, имеется значительная трещина или скол; перивителлиновое пространство отсутствует; blastopole большая, расширенная, затемненная или деформированная с цитоплазматическими включениями; клетки трофобласта могут быть деформированы, связь между отдельными клетками отсутствует; эмбриобласт деформирован, рыл-ный, часть клеток разрушена, отсутствует связь у большинства клеток</p>	

1.3.3. Свежеполученные и подлежащие замораживанию эмбрионы не должны быть контаминированы патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, грибами, вирусами и другими микроорганизмами.

1.4. Упаковка

1.4.1. Каждую серию свежеполученных эмбрионов после морфологической оценки помещают в соломинки (пайеты) или полиэтиленовые пробирки, содержащие питательную среду, состоящую из фосфатно-буферной среды с 20 %-ной фетальной сывороткой крови крупного рогатого скота или сыворотки крови для биотехнологических работ, или 0,4 %-ного альбумина бычьей сыворотки крови и санирующего препарата ГАМП в дозе 100 мкг/см³, или спермо-сан-ППК в дозе 200 ЕД/см³ среды. Укупорку соломинок (пайет), пробирок проводят в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

1.4.2. Эмбрионы, предназначенные для замораживания, после четырехкратной проводки через фосфатно-буферную среду, содержащую наиболее высокую концентрацию криопротектора 1,5 г/моль диметилсульфоксида (ДМСО) или 1,4 г/моль глицерина, 20 %-ную фетальную сыворотку крупного рогатого скота или 20 %-ную сыворотку крови для биотехнологических работ и санирующий препарат, помещают в пробирки или соломинки с указанной средой, закрывают пластиковыми пробками и замораживают в жидком азоте в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

1.5. Маркировка

1.5.1. Каждую пробирку или соломинку (пайету) маркируют, нанося несмываемой краской номер серии и дату получения эмбрионов.

1.5.2. Пробирки, соломинки (пайеты) с замороженными эмбрионами помещают в специальные канистры, которые переносят в сосуд Дьюара по ГОСТ 9293, содержащий не менее одной трети объема азота.

2. ПРИЕМКА

2.1. Свежеполученные и замороженные эмбрионы принимают сериями.

Под серией понимают любое количество эмбрионов, полученное от одной коровы-донора за один технологический цикл и оформленное одним документом о качестве (сертификат, см. приложение).

2.2. Каждая серия свежеполученных и замороженных эмбрионов должна быть принята (проверена) на предприятии-изготовителе специалистом этого предприятия.

2.3. Каждая серия замороженных эмбрионов после оттаивания при подготовке к пересадке их реципиентам должна быть принята (проверена) специалистом по пересадке эмбрионов предприятия-потребителя или изготовителя.

2.4. По требованию потребителя проверку санитарного состояния эмбрионов проводит отдел биологического контроля предприятия-изготовителя или ветлаборатория (районная, областная, краевая или республиканская).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Определение качества эмбрионов по морфологическим показателям.

3.1.1. Аппаратура, материалы и среды

Лупа бинокулярная марок МБС-9, МБС-10 или аналогичных марок.

Микроскоп марок МБИ-10, МБИ-13 или аналогичных марок.

Термостат с температурой нагрева 37—38 °С.

Сифон или шприц марки «Рекорд» с удлиненной иглой.

Чашки Петри или часовые стекла.

Цилиндры мерные вместимостью 500 см³ по ГОСТ 1770 или флаконы вместимостью 450—500 см³.

Пипетка Пастера.

Среда фосфатно-буферная с 20 %-ной фетальной сывороткой крови крупного рогатого скота или 20 %-ной сывороткой крови для биотехнологических работ.

Трипсин, раствор с массовой долей 0,25 %.

Санитрующе препараты.

3.1.2. Подготовка к испытанию

Растворы, полученные после вымывания эмбрионов из каждого рога матки коров-доноров, помещают с соблюдением правил асептики в отдельные стерильные эмбриоприемники вместимостью 450—500 см³ (цилиндры или флаконы), которые выдерживают в термостате при 37—38 °С или при комнатной температуре не ниже 18 °С в течение 20 мин для осаждения эмбрионов. Верхнюю часть раствора удаляют с помощью стерильного сифона или шприца с удлиненной иглой, оставляя 60—100 см³ раствора. Отстой переносят в 2—3 стерильные чашки Петри диаметром 90 мм, дно которых с внешней стороны расчерчено на квадраты со стороной 1 см.

3.1.3. Проведение испытания

Качество эмбрионов по морфологическим показателям определяют у всех свежеполученных эмбрионов и замороженных эмбрионов после их оттаивания.

Эмбрионы просматривают под бинокулярной лупой при увеличении 20—28^x. Определяют по морфологическим показателям эмб-

рионы с оценкой «плохие» и их удаляют. Оставшиеся эмбрионы обрабатывают раствором трипсина с массовой долей 25 % при 37—38 °С в течение 3—5 мин, а затем промывают 2 см³ стерильной фосфатно-буферной средой, содержащей 20 % фетальной сыворотки крови крупного рогатого скота или 20 % сыворотки крови для биотехнологических работ и saniрующей препарат. Промывку эмбрионов в стерильных средах проводят четыре раза. Для проводки эмбрионов через стерильные среды каждый раз используют новую чашку Петри и пипетку Пастера. После четвертой промывки эмбрионы просматривают под микроскопом марки МБИ-10 или МБИ-13 при увеличении 1×100[×] в том же составе среды.

3.1.4. Обработка результатов

Оценку качества эмбрионов по морфологическим показателям проводят в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.3.2.

Свежеполученные эмбрионы с оценкой «отличные» и «хорошие» подлежат замораживанию.

Свежеполученные эмбрионы с оценкой «отличные», «хорошие» и «удовлетворительные» используют для пересадки животным-реципиентам.

Свежеполученные эмбрионы с оценкой «условно пригодные» и «плохие» выбраковывают.

Эмбрионы, замороженные с оценкой «отличные», «хорошие», «удовлетворительные» и «условно пригодные», пересаживают животным-реципиентам.

Замороженные эмбрионы с оценкой «плохие» выбраковывают.

3.2. Определение санитарного состояния эмбрионов

3.2.1. Санитарное состояние определяют у свежеполученных эмбрионов и у эмбрионов, подлежащих замораживанию.

3.2.2. Санитарное состояние свежеполученных эмбрионов устанавливают на основании выборочного микробиологического исследования третьего промывного раствора среды по п. 3.1.3 не менее чем от 6 серий эмбрионов в квартал.

3.2.3. Санитарное состояние свежеполученных эмбрионов, подлежащих замораживанию, устанавливают на основании микробиологических исследований среды, использованной для подготовки эмбрионов к замораживанию после предпоследней промывки по п. 1.4.2.

3.2.4. Отбор проб

Отбирают по 2 см³ соответствующей среды, 1 см³ среды используют для микробиологических исследований, а 1 см³ среды помещают в стеклянную ампулу или полиэтиленовую пробирку, которые запаивают или закрывают полиэтиленовыми крышками и хранят в замороженном виде в сосуде Дьюара в архиве центра или пункта по трансплантации эмбрионов до использования всех эмбрионов данной серии. На пробирке наносят несмываемой краской номер серии.

3.2.5. Аппаратура, среда

Термостат с температурой нагрева 37—38 °С.

Термостат с температурой нагрева 20—22 °С.

Пипетки стеклянные градуированные вместимостью 1, 2 и 10 см³ по ГОСТ 20292.

Пробирки стеклянные вместимостью 20 см³ по ГОСТ 25336.

Среда тиогликолевая или МПБ, среда Тароцци и Сабуро.

3.2.6. Проведение испытания

В две пробирки с тиогликолевой средой вносят по 0,5 см³ исследуемой среды и выдерживают 10—14 сут — одну пробирку в термостате при температуре 37—38 °С, а другую в термостате при температуре 20—22 °С. При отсутствии тиогликолевой среды проводят высевы — 0,5 см³ исследуемого материала на среду с МПБ и по 2—3 капли на среду Тароцци и Сабуро (по одной пробирке). Посевной материал со средой МПБ и Тароцци инкубируют при температуре 37—38 °С, а со средой Сабуро при температуре 20—22 °С. В качестве контроля при тех же условиях выдерживают по одной пробирке использованной среды без посевного материала.

3.2.7. Обработка результатов

Через 10—14 сут ни в одной из пробирок с посевным материалом не должно быть роста микроорганизмов.

При выделении из посевного материала условно патогенной микрофлоры проводят тщательный контроль стерильности инструментов и сред, применяемых для вымывания, кратковременного хранения и замораживания эмбрионов, а также подготовки коров-доноров к извлечению эмбрионов.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Свежеполученные эмбрионы транспортируют в эмбриомобилях при температуре 22—25 °С в сопровождении специалиста по трансплантации эмбрионов.

Замороженные эмбрионы транспортируют в сосудах Дьюара с жидким азотом, с сопровождающим, всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки багажа, действующими на данном виде транспорта.

К транспортируемым эмбрионам прилагается подлинник сертификата.

4.2. Свежеполученные эмбрионы сохраняют в фосфатно-буферной среде, содержащей 20 % фетальной сыворотки крови крупного рогатого скота или 20 % сыворотки крови для биотехнологических работ, 0,4 % альбумина бычьей сыворотки крови и saniрующей препарат, при температуре 22—25 °С в течение 5 ч.

4.3. Замороженные эмбрионы сохраняют в фосфатно-буферной среде, содержащей 20 % фетальной сыворотки крупного рогатого

скота или 20 % сыворотки крови для биотехнологических работ, криопротектор (ДМСО или глицерин) и дезинфицирующий препарат, в жидком азоте при минус 196 °С.

4.4. Эмбрионы, оттаянные после замораживания, сохраняют в фосфатно-буферной среде, содержащей 20 % фетальной сыворотки крови крупного рогатого скота или 20 % сыворотки крови для биотехнологических работ и дезинфицирующий препарат, при температуре 22—25 °С не более 30 мин.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества эмбрионов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных стандартом, в пределах срока годности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

СЕРТИФИКАТ

на эмбрионы крупного рогатого скота №

Наименование центра (пункта) заготовки (трансплантации) эмбрионов и место его нахождения _____

Номер серии _____

Форма упаковки эмбрионов (пробирка, ампула, соломинка) _____

Количество эмбрионов в упаковке _____

Дата получения эмбрионов и день полового цикла коровы-донора _____

Возраст и стадия развития эмбрионов и морфологическая оценка _____

Для замороженных эмбрионов

Состав среды для замораживания, санирующие препараты и их доза _____

Время с момента получения до их замораживания, ч _____

Температура, при которой отправлены эмбрионы, °С _____

Режим оттаивания эмбрионов _____

Номер и тип сосуда Дьюара и номер канистры _____

Порода коровы-донора, клевка, номер и дата начала использования донора для получения эмбрионов _____

Порода быка-производителя, клевка, номер _____

Продуктивность коровы-донора _____

Продуктивные качества быка-производителя (выписано из племенного свидетельства) _____

Группа крови коровы-донора и быка-производителя _____

Сведения о состоянии здоровья животных и ветеринарно-санитарном состоянии ферм _____

У производителя и коровы-донора, их родителей и потомства нет генетически обусловленных болезней _____

Племенные животные, от которых получены эмбрионы, здоровы и происходят из ферм, свободных в течение последних 12 мес от инфекционных болезней крупного рогатого скота — туберкулеза (tuberculosis), паратуберкулеза (paratuberculosis), бруцеллеза (brucellosis), лейкоза (leucosis), инфекционного ринотрахеита (infectious bovin rhinotracheitis), вирусной диареи (virus diarrhea bovina), трихомоноза (trichomonosis), кампилобактериоза (campylobacteriosis), вибриоза (vibriosis), блутанга (bluetongue), эпизоотического аборта (epizootical abortus),

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госагропромом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н. И. Сергеев, д-р биол. наук (руководитель темы); С. В. Советкин, канд. биол. наук; Ю. В. Фомин, д-р вет. наук; М. Н. Ефремова; Е. В. Пронина, канд. хим. наук; Е. А. Назаров, вет. врач; А. Н. Мелентьев, канд. с.-х. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.01.90 № 10

3. Срок первой проверки — III кв. 1994 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1770—74	3.1.1
ГОСТ 9293—74	1.4.4
ГОСТ 20292—74	3.2.5
ГОСТ 25336—82	3.2.5

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *О. Я. Чернецова*

«Сдано в наб. 31.01.90 Подп. и печ. 13.04.90 1,25 усл. п. л. 1,25 усл. кр.-отт. 0,97 уч.-изд. л.
Тираж 3000 Цена 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопроспектский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 261