

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО  
8548-2—  
2011

---

Протезирование и ортезирование

## ДЕФЕКТЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

Часть 2

Метод описания ампутационной культи  
нижней конечности

ISO 8548-2:1993

Prosthetics and orthotics — Limb deficiencies — Part 2:  
Method of describing lower limb amputation stumps  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2013

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства для инвалидов»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 904-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 8548-2:1993 «Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей. Часть 2. Метод описания ампутационной культи нижней конечности» (ISO 8548-2:1993 «Prosthetics and orthotics — Limb deficiencies — Part 2: Method of describing lower limb amputation stumps»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	1
4 Измерения ампутационной культы нижней конечности . . . . .	1
4.1 Контрольные уровни и плоскости . . . . .	1
4.2 Измерения . . . . .	2
4.3 Оценка функционирования сустава . . . . .	2
5 Методы описания ампутационной культы нижней конечности . . . . .	2
5.1 Общие положения . . . . .	2
5.2 Частичная ампутация таза . . . . .	2
5.3 Вычленение в бедренном суставе . . . . .	3
5.4 Ампутация бедра (выше колена) . . . . .	4
5.5 Вычленение в коленном суставе . . . . .	5
5.6 Ампутация бедра (ниже колена) . . . . .	7
5.7 Вычленение лодыжки . . . . .	8
5.8 Частичная ампутация ноги . . . . .	10
Приложение А (справочное) Пояснения к таблицам 1—7 . . . . .	12
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации . . . . .	13

## Предисловие к ИСО 8548-2

Международная организация по стандартизации (ИСО) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов — членов ИСО). Разработка международных стандартов обычно осуществляется Техническими комитетами ИСО. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан Технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ИСО, также принимают участие в работах. ИСО тесно взаимодействует с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации электротехники.

Проекты международных стандартов разрабатываются в соответствии с правилами Директив ИСО/МЭК, часть 2.

Основная задача Технических комитетов заключается в подготовке международных стандартов. Проекты международных стандартов, одобренные Техническими комитетами, направляются членам этого комитета на голосование. Для их публикации в качестве международного стандарта требуется одобрение не менее 75 % членов комитета, принимавших участие в голосовании.

Следует обратить внимание на возможность наличия в настоящем стандарте некоторых элементов, которые могут быть объектом патентного права. ИСО не несет ответственности за идентификацию некоторых или всех таких патентных прав.

Международный стандарт ИСО 8548-2 подготовлен Техническим комитетом ИСО/ТК 168 «Протезирование и ортезирование».

ИСО 8548 состоит из следующих частей под общим наименованием «Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей»:

- Часть 1. Метод описания врожденных дефектов конечностей;
- Часть 2. Метод описания ампутационной культы нижней конечности;
- Часть 3. Метод описания ампутационной культы верхней конечности;
- Часть 4. Описание каузальных условий, ведущих к ампутации;
- Часть 5. Описание клинического состояния больного после ампутации.

В справочном приложении А информация приведена только для настоящего стандарта.

## Введение

Много разных систем было разработано для классификации ампутационной культи, но ни одна не добилась всеобщего признания. Причин для этого много. Члены коллективов клиник в разных странах, работая с разными пациентами и имея различные технические возможности, разрабатывали свои собственные системы для удовлетворения своих индивидуальных потребностей. Следовательно, существует необходимость в международной системе, которая должна быть разработана для того, чтобы сравнить одну публикацию с другой, одного пациента с другим. Различные группы пользователей оценят и используют унифицированную систему описания культи в хирургии, и заключения представителей различных дисциплин, разных докторов (особенно те, кто занимается реабилитацией), врачей, профессиональных терапевтов и протезистов. Эта система также имеет значение для эпидемиологов и чиновников здравоохранения.

Предлагаемая система должна удовлетворять потребности разных коллективов клиник, для того чтобы описание культи было зарегистрировано таким образом, что можно легко включить в отчеты. Эта часть ИСО 8548 сознательно направлена на определение минимальной информации, которая будет представлена. Эта информация должна допускать возможность включения в формы, разработанные отдельными учреждениями; информация также должна допускать возможность адаптации для компьютерной обработки.



## Протезирование и ортезирование

## ДЕФЕКТЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

## Часть 2

## Метод описания ампутационной культи нижней конечности

Prosthetics and orthotics. Limb deficiencies.  
Part 2. Method of describing lower limb amputation stumps

Дата введения — 2013—04—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод описания ампутационной культи нижней конечности и требования по оформлению регистрационных данных.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанные издания. Для недатированных ссылок применяют самые последние издания (включая любые изменения и поправки).

ИСО 8548-1:1989 Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей. Часть 1. Метод описания врожденных дефектов конечностей (ISO 8548-1:1989, Prosthetics and orthotics — Limb deficiencies — Part 1: Method of describing limb deficiencies present at birth)

ИСО 8549-1:1989 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам (ISO 8549-1:1989, Prosthetics and orthotics — Vocabulary — Part 1: General terms for external limb prostheses and external orthoses)

ИСО 8549-2:1989 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и их пользователям (ISO 8549-2:1989, Prosthetics and orthotics — Vocabulary — Part 2: Terms relating to external limb prostheses and wearers of these prostheses)

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 8548-1, ИСО 8549-1, ИСО 8549-2.

## 4 Измерения ампутационной культи нижней конечности

### 4.1 Контрольные уровни и плоскости

Контрольные уровни и плоскости для определения индивидуального уровня ампутации устанавливают согласно 4.1.1 и 4.1.2.

#### 4.1.1 Контрольные уровни

4.1.1.1 Уровень впадины промежности — ближайший к промежности уровень, позволяющий измерить объем бедра (культи) в плоскости, расположенной перпендикулярно к оси бедра.

4.1.1.2 Медиальная (средняя) линия сустава — уровень медиальной плоскости большой берцовой кости, если нет фиксированной деформации коленного сустава, который получается при измерении окружности культы, перпендикулярной к геометрической оси бедра.

4.1.1.3 Уровень конца культы — уровень окончания культы.

4.1.1.4 Уровень земли — уровень, на котором пациент стоит босиком.

4.1.1.5 Уровень отсечения — уровень культы при отсечении бедра и берцовой кости, уровень на средней стороне культы, при котором форма культы закругляется к концу.

4.1.1.6 Уровень минимальной толщины — уровень минимальной толщины культы бедра при вычленении колена и лодыжки.

4.1.1.7 Уровень бедренного мыщелка — уровень культы при вычленении колена.

4.1.1.8 Уровень максимальной периферической окружности (расположенной дистально) — уровень максимальной периферической окружности культы при вычленении лодыжки.

#### 4.1.2 Контрольные плоскости (применяется только для частичной ампутации ноги)

4.1.2.1 Плоскость пятки — плоскость пятки, параллельная центральной линии ноги.

4.1.2.2 Передняя берцовая плоскость — плоскость, параллельная центральной линии ноги, проходящая с передней стороны на уровне соединения большеберцовой кости и линии лодыжки.

4.1.2.3 Плоскость конца культы — плоскость окончания культы.

4.1.2.4 Плоскость пальцев ноги — плоскость кончиков пальцев контралатеральной ноги, параллельная центральной линии ноги.

## 4.2 Измерения

### 4.2.1 Измерение длины

Измеряют длину и записывают результаты в соответствии с требованиями соответствующей таблицы (см. таблицы 1—7) для конкретного уровня ампутации.

### 4.2.2 Измерение периметра

Измеряют периметр культы и записывают результаты в соответствии с требованиями таблиц (см. таблицы 1—7) для конкретного уровня ампутации.

## 4.3 Оценка функционирования сустава

### 4.3.1 Общие положения

Должны быть описаны такие характеристики сустава, как изменение диапазона движений в суставе, значительное снижение мышечной силы, а также явления нестабильности в суставе.

### 4.3.2 Измерение диапазона движений в суставе

Описывают любые изменения диапазона движений в суставе, используя методику измерения, в которой все измерения проводят от определенного начального положения конечности.

### 4.3.3 Оценка силы мышц

Фиксируют любое снижение силы мышц, приводящее к значительному снижению функций.

**Примечание 1** — Сила мышц может быть измерена достаточно точно, но это требует дорогостоящей и громоздкой аппаратуры. Измерение силы мышц не проводят в случае полиомиелита.

Субъективное суждение о степени силы мышц должно быть основано на оценке достаточности имеющейся силы мышц для стабилизации ближайшего сустава с культей в хорошо подогнанной приемной гильзе.

### 4.3.4 Оценка стабильности сустава

Записывают оценку стабильности сустава.

**Примечание 2** — Признано, что стабильность сустава является функцией целостности скелета, связок и нейромышечных элементов. В контексте настоящего стандарта неустойчивость сустава относится исключительно к костным и/или связочным дефектам и их последствиям.

## 5 Методы описания ампутационной культы нижней конечности

### 5.1 Общие положения

Описывают культю, используя указания, перечисленные в соответствующих таблицах (см. таблицы 1—7) и в приложении А.

### 5.2 Частичная ампутация таза

Используют данные, приведенные в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Описание регистрационных данных при частичной ампутации таза (см. 5.2 и приложение А)

Показатели	Данные, которые должны быть зарегистрированы
<b>Размеры</b>	Измерения не требуются
<b>Форма культи</b> Остаток таза	Отсутствует/представлен. Если контралатеральная нога имеется в месте ампутации, определяют уровень ампутации
<b>Кожные покровы культи</b> Послеоперационный рубец  Общее состояние	Заживший/незаживший Подвижный/плотно прилегающий Неповрежденная структура кожи/поврежденная структура кожи Нормальная чувствительность/поврежденная чувствительность Нет дополнительного рубцевания/дополнительное рубцевание
<b>Кровообращение</b> Отек	Нет/присутствует/чрезмерный
<b>Мягкие ткани культи</b> Степень атрофии Плотность	Адекватная/неадекватная/чрезмерная Нормальная/дряблая/отвердевшая
<b>Характер боли</b> Спонтанная боль Слабая (чувствительность к боли при нажатии) Болезненная неврома Фантомная боль Боль после иссечения	Нет/да Нет/да (распространенная)/да (локализованная) Нет/да Нет/да Нет/да

### 5.3 Вычленение в бедренном суставе

Используют данные, приведенные в таблице 2.

П р и м е ч а н и е 3 — Вычленение в бедренном суставе относится либо к ампутации в соединении ямки вертлужной впадины бедра, или к ампутации выше обычного рекомендованного уровня (см. 5.4).

Т а б л и ц а 2 — Описание регистрационных данных при вычленении бедра (см. 5.3 и приложение А)

Показатели	Данные, которые должны быть зарегистрированы
<b>Размеры</b>	Измерения не требуются
<b>Форма культи</b> Верхний остаток бедра	Отсутствует/представлен. Если контралатеральная нога имеется в месте ампутации, определяют уровень ампутации
<b>Кожные покровы культи</b> Послеоперационный рубец  Общее состояние	Заживший/незаживший Подвижный/плотно прилегающий Неповрежденная структура кожи/поврежденная структура кожи Нормальная чувствительность/поврежденная чувствительность Нет дополнительного рубцевания/дополнительное рубцевание
<b>Кровообращение</b> Отек	Нет/присутствует/чрезмерный
<b>Мягкие ткани культи</b> Степень атрофии Плотность	Адекватная/неадекватная/чрезмерная Нормальная/дряблая/отвердевшая
<b>Характер боли</b> Спонтанная боль Слабая (чувствительность к боли при нажатии) Болезненная неврома Фантомная боль Боль после иссечения	Нет/да Нет/да (обобщенная)/да (ограниченная) Нет/да Нет/да Нет/да

#### 5.4 Ампутация бедра (выше колена)

Используют данные, приведенные в таблице 3.

Примечание 4 — Рекомендуемым верхним уровнем для измерения длины культы является впадина промежности, но в случае деформации культы верхним уровнем для измерения длины культы будет являться самый высокий уровень, в котором возможно измерение объема культы в плоскости, расположенной перпендикулярно к центральной линии культы.

Таблица 3 — Описание регистрационных данных при ампутации бедра (выше колена) (не включать чрезмыщелковую и надмыщелковую ампутацию) (см. 5.4, рисунок 1 и приложение А)

Показатели	Данные, которые должны быть зарегистрированы
<b>Размеры</b>	Регистрируют следующие размеры <sup>1)</sup> : - длина от промежуточной впадины до конца культы $l_1$ ; - длина от конца кости до конца культы $l_2$ ; - длина контралатеральной ноги от промежуточной впадины до земли $l_3$ ; - длина контралатеральной ноги от средней линии сустава до земли $l_4$ ; - объем культы в промежуточной впадине $C_1$ ; - объем культы на уровне конца кости $C_2$ . Если контралатеральная нога имеется в месте ампутации, определяют уровень ампутации
<b>Форма культы</b> Общепринятая Конец бедренной кости	Цилиндрическая/коническая/булавовидная Не видно/видно
<b>Кожные покровы культы</b> Послеоперационный рубец Общее состояние	Заживший/незаживший Подвижный/плотно прилегающий Неповрежденная структура кожи/поврежденная структура кожи Нормальная чувствительность/поврежденная чувствительность Нет дополнительного рубцевания/дополнительное рубцевание
<b>Кровообращение</b> Цвет Температура исследуемой ноги Отек	Нормальный/синюшный/другой цвет Теплая/холодная Нет/присутствует/чрезмерный
<b>Мягкие ткани культы</b> Степень атрофии Плотность	Адекватная/неадекватная/чрезмерная Нормальная/дряблая/отвердевшая
<b>Характер боли</b> Спонтанная боль Слабая (чувствительность к боли при нажатии) Болезненная неврома Фантомная боль Боль после иссечения	Нет/да Нет/да (распространенная)/да (локализованная) Нет/да Нет/да Нет/да
<b>Состояние сустава бедра</b> Диапазон движения Сила мышц Стабильность Боль	Нормальный/нарушенный (специфический: изогнутый/расширенный или аддукция/движение конечности к средней линии) Никакого существенного сокращения / существенное сокращение Нормальная/нарушенная (срыв) Нет/да
<sup>1)</sup> Культя должна быть измерена у пациента в любом положении, кроме случая, когда пациент находится в возбужденном состоянии.	




Рисунок 1 — Измерения при ампутации бедра

### 5.5 Вычленение в коленном суставе

Используют данные, приведенные в таблице 4.

**Примечание 5** — Рекомендуемым верхним уровнем для измерения длины культы является впадина промежности, но в случае деформации культы верхним уровнем для измерения длины будет являться наивысший уровень, в котором возможно измерение объема культы в плоскости, расположенной перпендикулярно к центральной линии культы.

**Таблица 4** — Описание регистрационных данных при вычленении в коленном суставе (не включать чрезмыщелковую и надмыщелковую ампутацию) (см. 5.5, рисунок 2 и приложение А)

Параметры	Данные, которые должны быть зарегистрированы
<b>Размеры</b>	Регистрируют следующие размеры <sup>1)</sup> : - длина от промежной впадины до конца культы $l_1$ ; - длина контралатеральной ноги от промежной впадины до земли $l_3$ ; - длина контралатеральной ноги от средней линии сустава до земли $l_4$ ; - объем культы на уровне промежной впадины $C_1$ ; - минимальный объем культы $C_2$ ; - объем культы на уровне бедренного мыщелка $C_3$ . Если контралатеральная нога имеется в месте ампутации, определяют уровень ампутации
<b>Форма культы</b> Общепринятая	Цилиндрическая/коническая/булавовидная
<b>Кожные покровы культы</b> Послеоперационный рубец	Заживший/незаживший Подвижный/плотно прилегающий
<b>Общее состояние</b>	Неповрежденная структура кожи/поврежденная структура кожи Нормальная чувствительность/поврежденная чувствительность Нет дополнительного рубцевания/дополнительное рубцевание

Окончание таблицы 4

Параметры	Данные, которые должны быть зарегистрированы
<b>Кровообращение</b> Цвет Температура исследуемой ноги Отек	Нормальный/синюшный/другой цвет Теплая/холодная Нет/присутствует/чрезмерный
<b>Мягкие ткани культи</b> Степень атрофии Плотность	Адекватная/неадекватная/чрезмерная Нормальная/дряблая/отвердевшая
<b>Характер боли</b> Спонтанная боль Слабая (чувствительность к боли при нажатии) Болезненная неврома Фантомная боль Боль после иссечения	Нет/да Нет/да (распространенная)/да (локализованная) Нет/да Нет/да Нет/да
<b>Состояние сустава бедра</b> Диапазон движения Мускульная сила Стабильность Боль	Нормальный/нарушенный (специфический: изогнутый/расширенный или аддукция/движение конечности к средней линии) Никакого существенного снижения/существенное снижение Нормальная/нарушенная (срыв) Нет/да
<sup>1)</sup> Культи должна была измерена у пациента в любом положении, кроме случая, когда пациент находится в возбужденном состоянии.	




Рисунок 2 — Измерения при вычленении колена

### 5.6 Ампутация бедра (ниже колена)

Используют данные, приведенные в таблице 5.

**Примечание 6** — Рекомендованным верхним уровнем для измерения длины культы бедра является уровень медиального сустава, но в случае деформации культы верхним уровнем для измерения длины культы будет являться наивысший уровень, в котором возможно измерение объема культы в плоскости, расположенной перпендикулярно к центральной линии культы.

**Таблица 5** — Описание регистрационных данных при ампутации бедра (ниже колена) (см. 5.6, рисунок 3 и приложение А)

Параметры	Данные, которые должны быть зарегистрированы
<b>Размеры</b>	Регистрируют следующие размеры <sup>1)</sup> : - длина от промежной впадины до средней линии сустава $l_3$ ; - длина от средней линии сустава до конца культы $l_6$ ; - длина от конца кости до конца культы $l_2$ ; - длина контралатеральной ноги от промежной впадины до земли $l_3$ ; - длина контралатеральной ноги от средней линии сустава до земли $l_4$ ; - объем культы на средней линии сустава $C_3$ ; - объем культы у конца кости $C_2$ . Если контралатеральная нога имеется в месте ампутации, определяют уровень ампутации
<b>Форма культы</b> Общепринятая Конец большеберцовой кости Конец малоберцовой кости	Цилиндрическая/коническая/булавовидная Не видно/видно Не видно/видно
<b>Кожные покровы культы</b> Послеоперационный рубец  Общее состояние	Заживший/незаживший Подвижный/плотно прилегающий Неповрежденная структура кожи/поврежденная структура кожи Нормальная чувствительность/поврежденная чувствительность Нет дополнительного рубцевания /дополнительное рубцевание
<b>Кровообращение</b> Цвет Температура исследуемой ноги Отек	Нормальный/синюшный/другой цвет Теплая/холодная Нет/присутствует/чрезмерный
<b>Мягкие ткани культы</b> Степень атрофии Плотность	Адекватная/неадекватная/чрезмерная Нормальная/дряблая/отвердевшая
<b>Характер боли</b> Спонтанная боль Слабая (чувствительность к боли при нажатии) Болезненная неврома Фантомная боль Боль после иссечения	Нет/да Нет/да (распространенная)/да (локализованная)  Нет/да Нет/да Нет/да
<b>Состояние сустава</b> <b>Бедренный сустав</b> Диапазон движения (активный, пассивный) Сила мышц Стабильность <b>Коленный сустав</b> Диапазон движения Сила мышц Стабильность Боль после иссечения	  Нормальный/нарушенный (специфический: изогнутый/расширенный или аддукционный/движение конечности к средней линии) Никакого существенного сокращения/существенное сокращение Нормальная/нарушенная  Нормальный/нарушенный (специфический: изогнутый/расширенный) Никакого существенного сокращения / существенное сокращение Нормальная/нарушенная Нет/да
<sup>1)</sup> Культя должна была измерена у пациента в любом положении, кроме случая, когда пациент находится в возбужденном состоянии.	




Рисунок 3 — Измерения при ампутации по берцовой кости

### 5.7 Вычленение лодыжки

Используют данные, приведенные в таблице 6.

Примечание 7 — Рекомендуемым верхним уровнем для измерения длины культи является уровень медиального сустава, но в случае деформации культи верхним уровнем для измерения длины культи будет являться наивысший уровень, в котором возможно измерение объема культи в плоскости, расположенной перпендикулярно к центральной линии культи.

Таблица 6 — Описание регистрационных данных при вычленение лодыжки (см. 5.7, рисунок 4 и приложение А)

Параметры	Данные, которые должны быть зарегистрированы
<b>Размеры</b>	Регистрируют следующие размеры <sup>1)</sup> : - длина от промежуточной впадины до средней линии сустава $l_3$ ; - длина от средней линии сустава до конца культи $l_5$ ; - длина контралатеральной ноги от промежуточной впадины до земли $l_3$ ; - длина контралатеральной ноги от средней линии сустава до земли $l_4$ ; - объем культи на средней длине $C_5$ ; - минимальный объем культи $C_4$ ; - максимально удаленный от центра объем культи $C_6$ . Если контралатеральная нога имеется в месте ампутации, определяют уровень ампутации
<b>Форма культи</b> Общепринятая Соединительная ткань	Цилиндрическая/коническая/булавовидная Не видно/видно
<b>Кожные покровы культи</b> Послеоперационный рубец  Общее состояние	Заживший/незаживший Подвижный/плотно прилегающий Неповрежденная структура кожи/поврежденная структура кожи Нормальная чувствительность/поврежденная чувствительность Нет дополнительного рубцевания /дополнительное рубцевание

Окончание таблицы 6

Параметры	Данные, которые должны быть зарегистрированы
<b>Кровообращение</b> Цвет кожи Температура исследуемой ноги Отек	Нормальный/синюшный/другой цвет Теплая/холодная Нет/присутствует/чрезмерный
<b>Мягкие ткани культи</b> Степень атрофии Плотность	Адекватная/неадекватная/чрезмерная Нормальная/дряблая/отвердевшая
<b>Характер боли</b> Спонтанная боль Слабая (чувствительность к боли при нажатии) Болезненная неврома Фантомная боль Боль после иссечения	Нет/да Нет/да (распространенная)/да (локализованная) Нет/да Нет/да Нет/да
<b>Состояние сустава</b> <b>Бедренный сустав</b> Диапазон движения (активный, пассивный) Сила мышц Стабильность <b>Коленный сустав</b> Диапазон движения (активный, пассивный) Сила мышц Стабильность Боль после иссечения	Нормальный/нарушенный (специфический: изогнутый/расширенный или аддукционный/движение конечности к средней линии) Никакого существенного сокращения/существенное сокращение Нормальная/нарушенная Нормальный/нарушенный (специфический: изогнутый/расширенный) Никакого существенного сокращения/существенное сокращение Нормальная/нарушенная Нет/да
<sup>11</sup> Культи должна была измерена у пациента в любом положении, кроме случая, когда пациент находится в возбужденном состоянии.	




Рисунок 4 — Измерения при вычленении лодыжки

## 5.8 Частичная ампутация ноги

Используют данные, приведенные в таблице 7.

Т а б л и ц а 7 — Описание регистрационных данных при частичной ампутации ноги (см. рисунок 5)

Параметры	Данные, которые должны быть зарегистрированы
<b>Размеры</b>	Регистрируют следующие размеры <sup>1)</sup> : - длина от плоскости пятки до конца культи $l_g$ ; - длина от передней плоскости большой берцовой кости до конца культи $l_p$ ; - длина контралатеральной ноги от плоскости пятки до плоскости пальцев ноги $l_o$ . Регистрируют любое существенное несходство длины между сегментами ампутированной и контралатеральной ног
<b>Форма культи</b> Кости	Не видны/видны
<b>Кожные покровы культи</b> Послеоперационный рубец  Общее состояние	Заживший/незаживший Подвижный/плотно прилегающий Неповрежденная структура кожи/поврежденная структура кожи Нормальная чувствительность/поврежденная чувствительность Нет дополнительного рубцевания/дополнительное рубцевание
<b>Кровообращение</b> Цвет Температура исследуемой ноги Отек	Нормальный/синюшный/другой цвет Теплая/холодная Нет/присутствует/чрезмерный
<b>Мягкие ткани культи</b> Степень атрофии Плотность	Адекватная/неадекватная/чрезмерная Нормальная/дряблая/отвердевшая
<b>Характер боли</b> Спонтанная боль Слабая (чувствительность к боли при нажатии) Болезненная неврома Фантомная боль Боль после иссечения	Нет/да Нет/да (распространенная)/да (локализованная) Нет/да Нет/да Нет/да
<b>Состояние сустава</b> <b>Бедро</b> Диапазон движения (активный, пассивный) Сила мышц Стабильность <b>Колено</b> Диапазон движения Сила мышц Стабильность <b>Лодыжка</b> Диапазон движения Сила мышц Стабильность Боль после иссечения	Нормальный/нарушенный (опишите)  Никакого существенного снижения/существенное снижение Нормальная/нарушенная  Нормальный/нарушенный (опишите) Никакого существенного снижения/существенное снижение Нормальная/нарушенная  Нормальный/нарушенный (опишите) Никакого существенного снижения/существенное снижение Нормальная/нарушенная Нет/да
<b>Остаток стопы</b> Общепринятый Плоскостопный Другие деформации	Нормальное состояние/нарушенное (опишите) Нет/да Не существенные/существенные (специфические)
<sup>1)</sup> Культи должна была измерена у пациента в любом положении, кроме случая, когда пациент находится в возбужденном состоянии.	




Рисунок 5 — Измерения при частичной ампутации ноги

Приложение А  
(справочное)

## Пояснения к таблицам 1—7

**А.1 Общее положение**

В описание должны быть включены следующие основные элементы:

- а) размеры культи;
- б) форма культи;
- с) состояние кожных покровов культи;
- д) состояние кровообращения;
- е) состояние мягких тканей культи;
- ф) характер боли;
- г) состояние сустава, включая диапазон движения;
- h) соответствующие измерения контралатеральной ноги.

**А.2 Измерения**

Выбранные размеры являются наружными, их измерения не требуют никакого специального оборудования и могут быть выполнены любым сотрудником клинической бригады. Число используемых размеров должно быть достаточным для адекватного описания культи и ее пропорций.

**А.3 Форма**

Описания формы культи ограничены конической, булавовидной и цилиндрической. Булавовидная форма очевидна и часто понятия «цилиндрическая» или «коническая» не интерпретируются слишком буквально, эти формы являются одинаково описательными. Кроме того, важно сделать запись о том, что виден или не виден выступающий конец кости.

**А.4 Кожный покров**

При описании кожного покрова культи необходимо охарактеризовать его общее состояние. Достаточно отметить, не повреждена ли структура кожи и имеет ли кожа нормальную чувствительность. Отсутствуют требования для описания в подробностях самой операции разреза кожи, но должно быть зарегистрировано состояние послеоперационного рубца, зажил ли он, подвижен или нет. Наличие дополнительных рубцов должно быть отмечено.

**А.5 Кровообращение**

Можно отметить множество факторов, определяющих состояние кровообращения, но достаточно отметить:

- а) нормальна ли кожа, синюшная или другого цвета;
- б) теплая исследуемая нога или нет;
- с) присутствует ли отек.

Чрезмерный отек говорит о том, что пациенту придется снимать протез в течение дня, либо вообще о невозможности протезирования такого пациента.

**А.6 Мягкие ткани**

Мягкие ткани культи описаны только понятиями количества и плотности.

**А.7 Боль**

Боль как объект всегда трудно описать и в большинстве случаев нельзя измерить. Наличие или отсутствие значительной спонтанной боли, какой бы то ни было этиологии, чувствительность к боли при нажатии, болезненную невралгическую и фантомную боль нужно отличать от общих фантомных ощущений, и это должно быть зарегистрировано.

**А.8 Состояние сустава**

Следует отметить состояние ближайшего сустава по таким параметрам (показаниям), как диапазон движения, сила и стабильность, и также наличие боли в нем. Также должны быть отмечены нарушения подвижности (например, контрактуры) или чрезмерный объем движений.

**А.9 Контралатеральная нога**

Чтобы описание культи могло быть связано с пациентом в целом, контралатеральная нога нуждается в некотором описании минимальным числом размеров, например, длина от промежности до земли.

Приложение ДА  
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
национальным стандартам Российской Федерации**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 8548-1:1989	MOD	ГОСТ Р 53344—2009 (ИСО 8548-1:1989) «Протезирование и ортезирование. Дефекты конечностей. Часть 1. Метод описания врожденных дефектов конечностей»
ИСО 8549-1:1989	IDT	ГОСТ Р ИСО 8549-1—2011 «Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам»
ИСО 8549-2:1989	—	*
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p><b>Примечание</b> — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDT — идентичный стандарт;</li> <li>- MOD — модифицированный стандарт.</li> </ul>		

Редактор *О.А. Столянская*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.С. Кабашова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 22.07.2013. Подписано в печать 11.09.2013. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,85. Тираж 76 экз. Зак. 1003.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.  
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.