



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ШКУРКИ БЕЛКИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6374—66

Издание официальное

БЗ 5—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва



ГОСТ 6374-66, Шкурки белки невыделанные. Технические условия  
Undressed squirrel skins Specifications

**ШКУРКИ БЕЛКИ  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**Технические условия  
Undressed squirrel skins.  
Specifications**ГОСТ  
6374—66\***Взамен  
ГОСТ 6374—52Дата введения 01.07.67

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93).

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки белки — зверька из отряда грызунов, семейства беличьих.

2. Зимние шкурки белки имеют волосяной покров хребта и боков серого цвета различной темноты, иногда с наличием коричневой или рыжеватой полосы по хребту, череву — белое, за исключением кавказской белки, у которой оно рыжевато-желтое, а хребет — черно-бурый. Хвост — черного, черно-серого, серого, бурого (темно- или светло-бурого) или ярко-рыжеватого цветов.

3. Шкурки белки должны быть сняты трубкой с размером по огузку, с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, сухожилий, костей из лап и хвоста, жировых отложений, грязи и крови с мездры и волоса; оправлены узкой трубкой мездрой наружу и законсервированы пресно-сухим способом.

4. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения шкурки белки подразделяют по кряжам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Кряжи	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
1. Якутский	Якутская АССР, кроме девяти юго-западных районов, указанных в Ленском кряже (см. п. 5 табл. 1); Аяно-Майский, Николаевский, Охотский,	Волосяной покров особо пышный и шелковистый, преимущественно темно-серой окраски, с голубоватым или пепельным оттенком вдоль хребта. Череву с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (сентябрь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1973 г., августе 1988 г. (ИУС 10—73, 12—88).

© Издательство стандартов, 1993

Кряжи	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
2. Забайкальский	<p>имени Полины Осипенко, Тугуро-Чуминский, Ульчский районы Хабаровского края; Магаданская, Камчатская и Сахалинская области; Желтулакский, Зейский районы Амурской области; Каларский и Тунгиро-Олекминский районы Читинской области</p> <p>Бурятская АССР; Читинская область, кроме районов, указанных в Якутском кряже (см. п. 1 табл. 1)</p>	<p>Хвосты различной окраски. Мездра плотная, эластичная</p> <p>Волосяной покров пышный, грубоватый, преимущественно темно-серой окраски с буровато-красным оттенком, часто с резко выраженной коричневой полосой вдоль хребта. Черве с узкой ограниченной белой полосой; паха темные. Хвосты различной окраски. Мездра плотная, грубоватая</p>
3. Амурский	<p>Приморский, Хабаровский края и Амурская область, кроме районов, указанных в Якутском кряже (см. п. 1 табл. 1)</p>	<p>Волосяной покров пышный, грубоватый. Окраска хребта темно-пепельного, серого цвета с легким буроватым налетом. Хвосты различной окраски. Мездра плотная.</p>
4. Енисейский	<p>Красноярский край; Кемеровская, Томская, Новосибирская области</p>	<p>Волосяной покров пышный, менее шелковистый, светло-серо-голубой или темно-голубой окраски. Хвосты различной окраски. Мездра плотная</p>
5. Ленский	<p>Иркутская область; Вилюйский, Верхне-Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Ленинский, Олекминский, Орджоникидзевский, Сунтарский районы Якутской АССР</p>	<p>Волосяной покров пышный, средней шелковистости, серо-голубой и пепельно-серой окраски с голубоватым оттенком; встречаются шкурки с коричневатым налетом вдоль хребта. Черве с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные. Хвосты различной окраски. Мездра плотная</p>
6. Алтайский	<p>Горно-Алтайская автономная область - Алтайского края; Восточно-Казахстанская область Казахской ССР</p>	<p>Волосяной покров средней пышности и шелковистости, темно-серой окраски с буроватым или серой с голубоватым оттенком, иногда с коричневатобурым налетом вдоль хребта; окраска захватывает и пух. Черве с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные. Хвосты различной окраски. Мездра плотная</p>

## Продолжение табл. 1

Кряжи	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
7. Обский	Тюменская и Омская области	Волосяной покров пышный, но мало шелковистый светло-серой и серой окраски с голубоватым оттенком; иногда с желтоватым налетом на хребте. Череве с широкой, не резко ограниченной белой полоской; паха белые. Хвосты различной окраски. Мездра плотная
8. Северо-европейский	Башкирская АССР; Удмуртская АССР; Марийская АССР; Чувашская АССР; Татарская АССР; Мордовская АССР; Карельская АССР; Коми АССР; Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Кировская, Пермская, Куйбышевская, Ульяновская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Костромская, Горьковская, Ленинградская, Новгородская и Калининская области	Волосяной покров средней пышности и мягкости, светло-серой и серой окраски, с голубоватым или буроватым оттенком, часто с коричневой полосой на хребте. Череве с широкой белой полосой; паха белые. Хвосты различной окраски. Мездра средней плотности
9. Центральный	Калининградская, Псковская, Ярославская, Воронежская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Московская, Рязанская, Пензенская, Смоленская, Орловская, Курская, Тамбовская, Тульская и Брянская области, Эстонская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Белорусская ССР, Украинская ССР, Молдавская ССР	Волосяной покров малой пышности, грубоватый, серой окраски с буроватым оттенком, преимущественно с узкой рыжей полосой на хребте и пепельно-серой окраски с сильным рыжевато-красным оттенком, преимущественно с широкой красной полосой на хребте, окраска захватывает и пух. Череве с широкой желтовато-белой полосой; паха белые. Хвост бурой или ярко-рыжей окраски. Мездра плотная. Кроме того, встречаются шкурки с волосяным покровом низким, редким, темно-серой окраски, с узкой белой полосой на череве и черно-серым хвостом, а также шкурки черно-бурой окраски с ржаво-желтым черевом и ржаво-бурым хвостом
10. Телеутка	Алтайский край, кроме Горно-Алтайской автономной области; Ка-	Волосяной покров очень пышный, но грубоватый, светло-серой окраски, иногда с желтоватым налетом

Кряжи	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
11. Тувинский	захская ССР, кроме Восточно-Казахстанской области; Крымская и Курганская области; Грузинская ССР и северные районы Киргизской ССР Тувинская АССР	том на хребте. Черво с широкой белой полосой; паха белые. Хвост серой, редко — ярко-рыжей окраски. Мездра плотная. Размеры шкурок особо крупные.  Волосяной покров средней пышности и шелковистости от светло-голубой до темно-голубой окраски. Хвосты различной окраски. Мездра плотная

Примечание. Шкурки белки, добытые в Закавказье, относят к Центральному кряжу.

Основным показателем кряжа является характеристика волосяного покрова. Районы распространения являются дополнительным признаком.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

5. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки белки подразделяют на сорта в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Характеристика волосяного покрова и мездры
Первый	Полноволосые, с развившимися направляющими и остевыми волосами, густым пухом. Мездра плотная, чистая. Допускается синева у передних лапок или на голове, или по бокам в виде двух бледно-синих узких полос, тянущихся от головы до задних лапок, иногда захватывающих и голову
Второй	Менее полноволосые, с недоразвившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами, главным образом на шейке и голове. Мездра плотная с легкой синевой по хребту или синяя до половины шкурки по верхней или нижней части хребта. Шкурки молодняка со слабо развитыми остью и пухом; мездра тонкая, без синевы
Третий	Полуволосые, с низким волосяным покровом. Мездра утолщенная, темно-синяя. Допускаются незначительные остатки летнего волоса от головы до передних лапок по хребту и значительные по череву от головы до задних лапок

Примечания:

1. Ранневесенние полноволосые шкурки белки, но слегка перезрелые, с начинающим редеть волосяным покровом и сухой мездрой без признаков синевы принимаются со скидкой 10% от стоимости первого сорта.

2. Наличие на хребте шкурки рыжеватой или коричневатой полосы не понижает сортности шкурки.

6. В зависимости от наличия пороков шкурки белки подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
1. Прострелы мелкой дробью на хребте, расположенные не кучно	4—7	8—10	11—15
2. Прострелы мелкой дробью на хребте, расположенные кучно	Не допускаются	4—7	8—10
3. Запекшаяся кровь на волосе* общей площадью в см <sup>2</sup>	5,0—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0
4. Разрывы и швы по хребту общей длиной в см	2,0—5,0	5,1—10,0	Более 10 до однократной длины шкурки или разорванные поперек
5. Плешины общей площадью в см <sup>2</sup>	До 1 вкл.	1,1—3,0	3,1—5,0
6. Дыры, прострелы пульей, вытертые места — пигментированные пятна на мездре** общей площадью в см <sup>2</sup>	0,4—2,0	2,1—4,0	4,1—8,0
7. Неправильная съемка	Снятые пластом	—	—
8. Недостача частей шкурки	Головы	Головы с шей	—

\* Кровь на волосе около места ранения, заметная со стороны мездры.

\*\* Повреждения волосяного покрова, в результате которых со стороны мездры образовались синие пятна.

Примечание. Три прострела на череве учитывают как один на хребте.

7. На шкурках белки, относящихся к группе дефектов «малый», допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов.

На шкурках, относящихся к группе дефектов «средний», допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы, или двух пороков из группы дефектов «малый».

На шкурках, относящихся к группе дефектов «большой», допускается наличие одного порока, предусмотренного для этой

группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «средний», или четырех пороков из группы дефектов «малый».

При наличии на шкурках одного порока, предусмотренного в группе дефектов «средний», и двух пороков из группы дефектов «малый» шкурки переводят в группу дефектов «большой».

8. Шкурки белки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, шкурки весенние перезрелые, со значительно поредевшими остью и пухом или в процессе явно выраженной линьки с выпадающим волосяным покровом, тонкой, сухой, морщинистой, желтоватой или с темными пятнами мездрой, летние с низким грубым, почти без пуха волосяным покровом, темно-синей или желтой сухой мездрой, раннеосенние, с начавшим развиваться зимним, но еще низким волосяным покровом на огулке и с летним волосяным покровом на остальной части шкурки относят к нестандартным.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. (Исключен, Изм. № 2).

10. Упаковка и маркировка шкурок белки должны производиться по ГОСТ 12266—89.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок белки в процентах к стоимости первого сорта  
(рекомендованная Центросоюзом)

Сорта	Нормальные	Группы дефектов		
		Малый	Средний	Большой
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Первый ранневесенний	90,0	81,0	67,5	45,0
Второй	80,0	72,0	60,0	40,0
Третий	50,0	45,0	37,5	25,0

Примечание. Нестандартные шкурки оценивают не более 25% качества шкурок первого сорта группы дефектов «нормальная».

(Измененная редакция, Изм. № 2).